



OUEST  
CONSEIL ELEVAGE

# Diagnostic

## Elevage des génisses

La Normande  
www.lanormande.com

Numéro de cheptel :

Date :

Nom de l'exploitant :

tél :

Adresse :

Technicien Normand :

### Stratégie d'élevage

Répartition des vèlages	Étalés		Groupés sur printemps, été, automne, hiver		
	Objectif éleveur	Résultat actuel		Objectif éleveur	Résultat actuel
Age au vèlage en mois			Tx de renouvellement en %:		
Nb génisses élevées par an			Nb génisses vendues par an :		

### Avant la naissance et autour du vèlage

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Alimentation de la vache tarie	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>Etat corporel entre 3 et 4</li> <li>Alimenter comme une vache produisant 10-15 litres de lait</li> <li>Distribution de fourrages secs+AMV l'automne</li> </ul>
Parasitisme et vaccination	++			Veiller à l'absence de douve Vaccination contre les diarrhées du veau Vaccination BVD
Gestion des vèlages	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laisser la vache vèler seule le plus possible</li> <li>Vérifier avant de tirer le veau</li> <li>Hygiène</li> </ul>
Accueil du veau	+			Bouchonner le veau pour limiter les pertes caloriques Réanimation du veau Dégager voies respiratoires
Désinfection du cordon	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tremper l'intégralité du cordon avec de l'iode.</li> <li>Renouveler si le cordon n'est pas sec</li> <li>Veiller à la propreté et à l'humidité du logement</li> </ul>

## La phase colostrale

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Rapidité d'apport	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apporter à volonté dans les 6 premières heures</li> <li>• Colostrum de la 1ère traite, chaud (40 °C)</li> </ul>
Qualité du colostrum	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Congeler le colostrum de vaches saines et multipares (décongélation bain marie)</li> <li>• Utiliser un réfractomètre pour vérifier la qualité</li> </ul>
Distribution du colostrum	+			La distribution doit se poursuivre 3 jours si possible avec du lait du 1er jour

## Phase lactée

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Plan d'allaitement pratiqué	+			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respect des quantités et du rythme de distribution (outils de mesure)</li> <li>• Contrôle du DAL</li> </ul>
Si lait entier	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiller à la régularité du TB et du TP</li> <li>• Distribution du lait régulière à 40°C</li> <li>• Ne pas diluer le lait avec de l'eau</li> </ul>
Si aliment d'allaitement	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisir un aliment à plus de 17 % de MG et 21-24 % de MP</li> <li>• 2 repas/j : 125 g/litre de buvée</li> <li>• 1 repas/j : 200 g/litre de buvée</li> <li>• Temps de brassage d'au moins 30 sec.</li> <li>• Température de dilution proche de 60°C</li> <li>• Température de distribution à 40 °C</li> </ul>
Têtage	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence d'anneau anti têtage ou autres pratiques anti têtage</li> </ul>

## Sevrage et alimentation solide

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Distribution du concentré	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apport dès la 1ère semaine</li> <li>• Concentré à 1 UF et 115 g PDI/kg</li> <li>• Mouture grossière des céréales (attention au triticale et blé)</li> <li>• Apport en graines entières du maïs grain et protéagineux</li> <li>• Distribuer en 2 repas/j individualisé</li> </ul>
Distribution du fourrage	+			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foin ou paille accessible et de qualité</li> <li>• Apport dès 2ème semaine</li> <li>• Ensilage de maïs à plus de 30 % de MS</li> </ul>
Eau	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eau propre et potable à disposition</li> </ul>
Sevrage	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminution du lait sur 2 semaines</li> <li>• Dès que le veau consomme 2 kg de concentré minimum</li> </ul>

## Santé du veau avant sevrage (diarrhées)

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Prévention des diarrhées	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eau propre et potable à volonté</li> <li>• Vaccination des mères si élevage à risques colibacilles/virus</li> <li>• Réalisation de coproscopie</li> <li>• Si antibiothérapie, voie orale</li> <li>• Alimentation calée sur les recommandations (éviter les stress et les situations d'acidose)</li> <li>• Ambiance et hygiène de la nurserie, du box de vêlage et du petit matériel (seau)</li> </ul>
Réaction de l'éleveur	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de température (voir vétérinaire si température)</li> <li>• Diminution des quantités de lait</li> <li>• Rapidité</li> </ul>
Traitement	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhydratant ou perfusion,</li> <li>• Pansement intestinal,</li> <li>• Antibiotique selon prescription vétérinaire</li> </ul>

## Santé du veau (problèmes respiratoires)

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Prévention des maladies respiratoires	+ + +			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colostrum,</li> <li>• Hygiène nurserie et box vêlage</li> <li>• Mélange classe d'âge</li> <li>• Vaccination des veaux</li> <li>• Analyse (prise de sang malade ou mort)</li> </ul>
Réaction éleveur	+			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapidité,</li> <li>• Isolement malade,</li> <li>• Prise température</li> </ul>
Traitement	+ +			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-inflammatoire,</li> <li>• Antibiotique selon prescription vétérinaire,</li> <li>• Autre selon prescription</li> </ul>

## Du sevrage à 6 mois

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Régimes alimentaires	+ +			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foin à volonté + 2.5 kg de concentré (3 kg après 4 mois) + 40 g AMV</li> <li>• Paille à volonté + 2.5 à 3.5 kg concentré équilibré + 60 g AMV</li> <li>• Ensilage de maïs + 0,6 à 0,8 kg de correcteur azoté (en fonction du foin et du maïs) + 100 g AMV</li> <li>• Ensilage d'herbe à volonté + 0,4 kg de correcteur azoté + 100 g AMV (+1 kg céréales pour les jeunes)</li> </ul>
Si ensilage de maïs	+ + +			<ul style="list-style-type: none"> <li>• quantité distribuée mesurée (seau, pesée)</li> </ul>
Suivi des croissances et repères	+			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi possible avec               <ul style="list-style-type: none"> <li>– pesée : 90 –100 kg au sevrage et 200 kg à 6 mois</li> <li>– Tour de poitrine : 133 cm à 6 mois</li> </ul> </li> </ul>

## Pâturage et parasitisme



Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Caractéristiques générales	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>•1 à 1,5 ares par mois d'âge au printemps,</li> <li>•Agrandissement surface estival (+30%)</li> <li>•Mâles et femelles séparés,</li> <li>•3 mois d'écart d'âge maxi</li> </ul>
Gestion du parasitisme	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Traitement raisonné sur 1ère année pâture,</li> <li>•Traitement sur symptômes les années suivantes</li> <li>•Analyse douve / paramphistome</li> </ul>
Organisation du travail	+			Visite régulière (1 fois par jour), Point d'eau propres et adaptés Contention disponible et adaptée

## Reproduction et vêlage primipare

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Mise à la reproduction	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dès que possible, selon le poids et l'âge.</li> <li>•Bâtiment clair,</li> <li>•Parcelle proche</li> </ul>
Fertilité / fécondité	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Taux réussite sur IA 1 &gt; 70% (&gt;55% si sexée)</li> <li>•Taux réussite sur IA3 et + &lt;15 %</li> <li>•Taux génisses stériles</li> </ul>
Vêlage primipare	+++			Préparation vêlage, Intégration progressive dans troupeau VL Performance 1 <sup>er</sup> contrôle = 80% multipares Absence accident au vêlage Absence métrite, acétonémie

# Quelques mesures objectives...

## Note Etat d'engraissement



## Logement du veau

Rubrique	Importance	Correct	A revoir	Recommandations
Dimension et équipement	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surface mini : 2 m<sup>2</sup> par veau</li> <li>• Volume : 10 m<sup>3</sup> par veau</li> <li>• 10 cm entre le sol et le fond du seau</li> </ul>
Ambiance	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposition Sud-Sud Est</li> <li>• Température entre 5 et 25°C (variation &lt; 8°C)</li> <li>• Vitesse d'air : moins de 0,30 m/sec en hiver</li> </ul>
Si case individuelle en bâtiment	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir un caillebotis pour récupérer les jus</li> <li>• 2 porte-seaux au minimum</li> <li>• Râtelier accessible</li> <li>• Adapter la taille à la durée de logement</li> </ul>
Si case collective	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 à 3 m<sup>2</sup> de couchage par veau</li> <li>• Hauteur de la marche : 40 cm</li> <li>• Blocage des veaux 15 minutes après la buvée</li> </ul>
Entretien	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 0,5 à 1 kg de paille/jour/veau</li> <li>• Vide sanitaire une fois par an (15 j à 3 sem.)</li> <li>• Désinfection après chaque veau en case indiv.</li> </ul>

## Logement de la génisse

Aire paillée Dimension	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 à 12 mois : 3 à 3,5 m<sup>2</sup>/génisse</li> <li>• 12 à 18 mois : 3,5 à 4,5 m<sup>2</sup>/génisse</li> <li>• 18 à 24 mois : 5 à 6 m<sup>2</sup>/génisse</li> <li>• Ajouter 0,5 m<sup>2</sup> si pas de quai</li> <li>• Volume entre 20 et 30 m<sup>3</sup></li> </ul>
Ambiance	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Génisses propres et secs</li> <li>• Couchage sur toute la surface,</li> <li>• Absence d'odeur d'ammoniac,</li> <li>• Absence de paillot humide</li> </ul>
Accès auge	++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cornadis : Une place par génisse,</li> <li>• Barre : 50 cm à 6 mois, 60 à 12 M, 70 à 18 M et +</li> </ul>
Logettes	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur : 80 à 6 mois / 90 à 12 M / 115 à 18 M,</li> <li>• Longueur : 210 / 230 / 250 cm,</li> <li>• Hauteur Barre de cou : 75 / 90 / 105</li> <li>• Seuil / Barre de cou : 140 / 150 / 165 cm</li> </ul>
Entretien	+++			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vide sanitaire une fois par an (15 j à 3 sem.)</li> </ul>



OUEST  
CONSEIL ELEVAGE

# Diagnostic élevage des génisses Synthèse

La Normande  
www.lanormande.com

Numéro de cheptel :

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Date :

Tél :

Technicien Normand :

## Les priorités à travailler en accord avec l'éleveur

Rubrique de l'action	Importance	Corrections envisagées	Intervenant	Périodes

Intervenant	Organisme	Demande transmise par :	Demande transmise le :

Signature Eleveur

Signature technicien